

ML COMPLETES COMMUNES

MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE/MERCERYL/MERCERYLSPRAY

DENOMINATION DU MEDICAMENT : ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée ; ●MERCERYL, solution pour application cutanée ; ●MERCERYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé. **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :** ●MERCERYL ET MERCERYLSPRAY : Chlorure de benzalkonium 0,500 g sous forme de solution de chlorure de benzalkonium 0,985 g, digluconate de chlorhexidine 0,200 g sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine 1,065 g. Pour 100 ml. ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : Solution de chlorure de benzalkonium 0,985 g. Quantité correspondant à chlorure de benzalkonium 0,500 g. Solution de digluconate de chlorhexidine 1,065 g. Quantité correspondant à digluconate de chlorhexidine 0,200 g. Pour 100 ml. **FORME PHARMACEUTIQUE :** Solution pour application cutanée. **DONNEES CLINIQUES :** **Indications Thérapeutiques :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : Nettoyage et traitement d'appoint des affections cutanéomuqueuses primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter. ●MERCERYL et MERCERYLSPRAY : Antiseptie ou nettoyage des petites plaies superficielles. Remarque : les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes. **Posologie et mode d'administration :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE et MERCERYL : La solution s'utilise pure ou diluée 1 ou 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Utilisation pure : en application sur la peau. Utilisation diluée au 1/10^{ème} : en application sur les muqueuses. La solution diluée doit être préparée extemporanément et ne doit pas être conservée. ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : L'application sera toujours suivie d'un rinçage soigneux. ●MERCERYLSPRAY : Pulvériser la solution, sur la zone à traiter, 1 à 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours. **Contre-indications :** Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment à la chlorhexidine (ou à sa classe chimique) ou au chlorure de benzalkonium (de la famille des ammoniums quaternaires). Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles. Ce produit ne doit pas pénétrer dans le conduit auditif en particulier en cas de perforation tympanique, ni, d'une façon générale, être mis au contact du tissu nerveux ou des méninges. Cette préparation ne doit pas être utilisée pour la désinfection du matériel médico-chirurgical. **Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :** Usage externe. Bien que la résorption cutanée soit très faible, le risque d'effets systémiques ne peut être exclu. Ils sont d'autant plus à redouter que l'antiseptique est utilisé sur une grande surface, sur une peau lésée (notamment brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrissons (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège). Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une contamination microbienne est possible. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :** L'emploi simultané ou successif d'antiseptiques anioniques est à éviter. **Grossesse et allaitement :** Ne pas appliquer la solution sur les seins pendant l'allaitement. **Effets indésirables :** ●MERCERYL ET MERCERYLSPRAY : Possibilité d'eczéma de contact (en raison de la présence de chlorure de benzalkonium). ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : Sensation de sécheresse de la peau et des muqueuses qui est atténuée par un rinçage soigneux. Légères irritations cutanées au début des applications. Possibilité d'eczéma de contact. **Surdosage :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : L'application de trop fortes doses risque d'entraîner une exacerbation des effets indésirables. En cas de surdosage, rincer abondamment à l'eau. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :** **Propriétés pharmacodynamiques :** **Classe pharmacothérapeutique :** ANTISEPTIQUE (D. Dermatologie). Association de chlorure de benzalkonium, ammonium quaternaire et de digluconate de chlorhexidine, dérivé cationique des biguanides. Antiseptique bactéricide à large spectre, actif in vitro sur les germes Gram +, Gram -, ainsi que sur *Candida albicans*. Activité rapide à partir d'un temps de contact de 1 minute. La perte d'activité en présence de protéines et d'exsudat est faible. ● **Propriétés pharmacocinétiques :** Absorption cutanée quasiment nulle pour la chlorhexidine et le chlorure de benzalkonium. **DONNEES PHARMACEUTIQUES :** **Liste des excipients :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : Solution à 30% d'alkyldiméthylbétaine, copolymère d'éthylène oxyde et propylène oxyde, hydroxyéthylcellulose, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, eau purifiée. ●MERCERYL et MERCERYLSPRAY : Acide citrique monohydraté, citrate de sodium, eau purifiée. ●MERCERYLSPRAY : Gaz pulseur = azote. **Incompatibilités :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : Incompatible avec les composés anioniques. **Durée de conservation :** 3 ans. **Précautions particulières de conservation :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE et MERCERYL : Pas de précautions particulières de conservation. ●MERCERYLSPRAY : Récipient sous pression : à protéger des rayons du soleil et à ne pas exposer à une température supérieure à + 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. **Nature et contenu de l'emballage extérieur :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : 300 ml en polyéthylène haute densité avec bouchon à charnière en polypropylène ; 1 000 ml en polyéthylène haute densité avec bouchon à vis en polyéthylène haute densité. ●MERCERYL : 125 ml en flacon (PE). ●MERCERYLSPRAY : 50 ml en flacon pressurisé (Aluminium vernis). **Précautions particulières d'élimination et de manipulation :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : La solution diluée est à préparer extemporanément et ne doit pas être conservée. **TITULAIRE/EXPLOITANT DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :** MENARINI FRANCE - 1/7 RUE DU JURA - ZONE SILIC - RUNGIS - 91320 WISSOUS. **NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :** ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : 353 562-9 : 300 ml en flacon (PEHD) ; 353 563-5 : 1000 ml en flacon (PEHD). ●MERCERYL : 354 568-0 : 125 ml en flacon (PE). ●MERCERYLSPRAY : 354 567-4 : 50 ml en flacon pressurisé (Aluminium vernis). **DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION :** ●MERCERYL ET MERCERYLSPRAY : 6 juillet 2000. ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : 19 novembre 1998. **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :** ●MERCERYL ET MERCERYLSPRAY : 28 août 2009 V1A. ●MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE : 21 juin 2010 V1A. **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :** Médicament non soumis à prescription médicale. Agréé Coll. Non remboursé.

Les informations recueillies font l'objet de traitements informatiques destinés aux laboratoires MENARINI, pour l'activité de la visite médicale et pour répondre aux obligations légales de transparence et de publication des liens des entreprises. Conformément à la loi 78-17 modifiée par la loi 2004-801, vous pouvez exercer à tout moment votre droit d'accès et de rectification des données vous concernant auprès de MENARINI France 1, rue du Jura - BP 40528 - 94633 RUNGIS Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement destiné à l'activité de visite médicale, portant sur des données vous concernant.