

# BIOCIDAN

0,1mg/0,4ml

*Collyre en unidoses*

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### Composition

Bromure de céthexonium 0,1 mg  
Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables  
q.s.p. pour un récipient unidose de 0,4 ml.

### Forme et Présentation

Collyre

### Classe Pharmaco-Thérapeutique

- organe des sens (œil)
- antiseptique local

### Exploitant

MENARINI France  
1/7 rue du Jura  
Silic 528  
94633 Rungis cedex

### FABRICANT

Unither, Amiens (80-France)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé comme traitement de certaines infections superficielles de l'œil et de ses annexes.

## ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** en cas d'antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une réutilisation lors des administrations suivantes.
- Ne touchez pas l'œil avec l'extrémité de l'unidose.
- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- La posologie préconisée doit être respectée et le traitement ne doit pas être prolongé au delà de 15 jours.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, vous devez attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement à votre médecin ou à votre pharmacien tout autre traitement en cours, en particulier les autres collyres utilisés.



## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### Posologie

1 goutte 3 à 4 fois par jour.

### Mode et voie d'administration

Voie locale. En instillation oculaire.

Instiller 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur en tirant la paupière inférieure légèrement vers le bas et en regardant vers le haut.

### POUR UTILISER L'UNIDOSE, VOUS DEVEZ PROCÉDER DE LA FAÇON SUIVANTE:

- Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation, ouvrir l'enveloppe dans laquelle sont conditionnées les unidoses




Sortir la plaquette de son enveloppe protectrice



- Arracher l'unidose de la plaquette en saisissant l'ampoule à détacher dans une main et la plaquette dans l'autre main



- Pour ouvrir l'unidose, prendre une extrémité dans chaque main et effectuer vigoureusement une rotation afin de rompre la soudure



- Renverser l'unidose, afin d'en faire descendre le contenu vers l'extrémité ouverte, instiller le collyre dans l'œil ou les yeux à traiter, en pressant l'unidose.



Afin d'instiller une solution toujours stérile, utiliser une nouvelle unidose lors de chaque application.

**Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré**

Le médicament doit être administré 3 à 4 fois par jour.

### Durée du traitement

En moyenne 7 jours. Ne pas prolonger le traitement au delà de 15 jours.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Une réaction d'intolérance locale est possible.

En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

**SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE**

## CONSERVATION

- \* NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR
- \* PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION  
Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

- \* MISE EN GARDE EN CAS DE SIGNES VISIBLES DE DÉTERIORATION:  
Ce médicament ne doit pas être conservé après ouverture et doit être jeté après usage.

## DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Juillet 1997



Code Rouge 65NOT2242/E



\* 6 5 N 0 T 2 2 4 2 / E \*

