

ML COMPLETES
BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre

DENOMINATION DU MEDICAMENT BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre.
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Bromure de céthexonium 0,025 g. Pour 100 ml de solution. **FORME PHARMACEUTIQUE** Collyre en solution **DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques** Traitement d'appoint antiseptique des affections superficielles de l'œil et de ses annexes. **Posologie et mode d'administration** 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival inférieur 3 à 4 fois par jour, pendant 7 jours en moyenne. **Contre-indications** Antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires. **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi** **Précautions d'emploi** En cas d'hypersensibilité, interrompre le traitement. Le traitement doit être limité à 15 jours : l'utilisation intensive ou prolongée peut être à l'origine d'altérations de l'épithélium conjonctival et (ou) cornéen. La prudence s'impose notamment en cas d'anomalies épithéliales. Eviter l'utilisation chez les porteurs de lentilles de contact : les ammoniums quaternaires peuvent être adsorbés par les lentilles hydrophiles et être à l'origine d'intolérance locale de celles-ci. - En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent, espacer de 15 minutes les instillations. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions** Ne pas associer deux antiseptiques. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent ; espacer de 15 minutes les instillations. **Grossesse et allaitement** Compte tenu des données disponibles, l'utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite est possible. **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines** Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre en solution. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'au retour de la vision normale. **Effets indésirables** Possibilité de réaction d'intolérance locale (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi»). Risque de réaction d'hypersensibilité **Surdosage** En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques** Le céthexonium est un antiseptique appartenant à la classe des ammonium quaternaires. **Propriétés pharmacocinétiques** Les propriétés mouillantes des ammonium quaternaires favorisent leur passage à travers la cornée. **DONNEES PHARMACEUTIQUES** **Liste des excipients** Chlorure de sodium, eau pour préparation injectables. **Durée de conservation** Avant première ouverture du flacon : 5 ans. Après première ouverture du flacon : 28 jours. **Précautions particulières de conservation** : Pas de précautions particulières de conservation. **Nature et contenu de l'emballage extérieur** 10 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène). **Précautions particulières d'élimination et de manipulation** Pas d'exigences particulières **TITULAIRE/EXPLOITANT DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : MENARINI FRANCE 1/7, RUE DU JURA- ZONE SILIC - RUNGIS 91320 WISSOUS NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 301 169.4** : 10 ml en flacon compte-gouttes (polyéthylène). **DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION** 16 février 1995 / 21 octobre 2006 **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE::** 02/12/2010 V2P **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** : Non listé. - Remb. Séc. Soc. à 30% Agréé Collect. **PRIX** 2,46 €