

NOTICE
ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé
Olmésartan médoxomil/hydrochlorothiazide

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALTEISDUO contient deux substances actives, l'olmésartan médoxomil et l'hydrochlorothiazide, utilisées pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension) :

- L'olmésartan médoxomil appartient à un groupe de médicaments appelés « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». Il diminue la pression artérielle en relâchant les vaisseaux sanguins.
- L'hydrochlorothiazide appartient à un groupe de médicaments appelés « diurétiques thiazidiques » (médicaments qui augmentent la quantité d'urine que vous produisez). Il diminue la pression artérielle en aidant l'organisme à se débarrasser des liquides en excès en faisant en sorte que vos reins produisent plus d'urine.

ALTEISDUO vous sera prescrit seulement si ALTEIS (olmésartan médoxomil seul) n'a pas suffisamment contrôlé votre pression artérielle. Les deux substances actives de ALTEISDUO permettent ensemble de diminuer la pression artérielle de manière plus importante que si elles étaient prises seules.

Vous prenez peut-être déjà des médicaments pour traiter votre pression artérielle, mais votre médecin peut vous prescrire ALTEISDUO pour la diminuer encore plus.

Une pression artérielle élevée peut être contrôlée par des médicaments comme ALTEISDUO. Votre médecin vous a probablement aussi recommandé de modifier votre mode de vie afin de

réduire davantage la pression artérielle (par exemple perdre du poids, arrêter de fumer, réduire votre consommation de boissons alcoolisées et de sel). Votre médecin peut aussi vous inciter à la pratique d'un exercice régulier, comme la marche ou la natation. Il est important de suivre les conseils de votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALTEISDUO

40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives, ou à l'un des autres composants de ces comprimés (voir la rubrique « Informations supplémentaires ») ou à des substances similaires à l'hydrochlorothiazide (sulfonamides),
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ALTEISDUO en début de grossesse - voir la rubrique « Grossesse »),
- Si vous avez des problèmes rénaux,
- Si vous souffrez d'un taux faible de potassium, d'un taux faible de sodium, d'un taux élevé de calcium ou d'un taux élevé d'acide urique dans le sang (qui peut provoquer des crises de goutte) ne s'améliorant pas avec le traitement,
- Si vous souffrez de problèmes modérés ou graves du foie ou d'un jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse) ou de problèmes de drainage de la bile au départ de la vésicule biliaire (obstruction des voies biliaires comme par exemple calculs biliaires).

Si vous pensez être dans l'une de ces situations, ou si vous n'en êtes pas sûr, ne prenez pas les comprimés. Parlez-en d'abord à votre médecin et suivez son conseil.

Faites attention avec ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé:

Avant de prendre les comprimés, **informez votre médecin** si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

- Transplantation rénale,
- Maladie du foie,
- Insuffisance cardiaque ou problèmes avec vos valves cardiaques ou votre muscle cardiaque,
- Vomissements (haut-le-cœur) ou diarrhée abondante ou qui persiste depuis plusieurs jours,
- Traitement à forte dose par des médicaments qui augmentent la quantité d'urine que vous produisez (diurétiques) ou si vous suivez un régime pauvre en sel,
- Problèmes avec vos glandes surrénales (par exemple aldostéronisme primaire),
- Diabète,
- Lupus érythémateux (une maladie autoimmune),
- Allergies ou asthme.

Votre médecin voudra peut-être vous voir plus souvent et faire des tests si vous êtes dans l'une de ces situations.

ALTEISDUO peut entraîner une augmentation des taux de lipides et d'acide urique dans le sang (l'origine des crises de goutte – gonflement douloureux des articulations). Votre médecin voudra probablement faire des analyses de sang de temps en temps pour vérifier ces taux.

ALTEISDUO peut modifier les taux de certaines substances chimiques de votre sang appelées « électrolytes ». Votre médecin voudra probablement faire des analyses de sang de temps en temps pour vérifier ces taux. Les signes de changement des électrolytes sont : soif, sécheresse de la bouche, douleurs musculaires ou crampes, fatigue musculaire, faible pression artérielle (hypotension), sensation de faiblesse, de paresse, de fatigue, envie de dormir ou agitation, nausées, vomissements, moindre envie d'uriner, rythme cardiaque rapide.

Informez votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Comme avec tout médicament qui réduit la pression artérielle, une baisse excessive de la pression artérielle chez des patients présentant des perturbations de la circulation sanguine au niveau du cœur ou du cerveau peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Votre médecin doit donc vérifier votre pression artérielle avec précaution.

Si vous devez subir des examens de la glande parathyroïde, vous devez arrêter de prendre ALTEISDUO avant que ces examens ne soient effectués.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. ALTEISDUO est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir la rubrique « Grossesse »).

Enfants et adolescents

ALTEISDUO est déconseillé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Patients noirs

Comme avec d'autres médicaments similaires, l'effet de ALTEISDUO pour diminuer la pression artérielle est un peu plus faible chez les patients noirs.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Veuillez indiquer en particulier à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment l'un des médicaments suivants :

- Médicaments qui peuvent augmenter les taux de potassium dans le sang s'ils sont utilisés en même temps que ALTEISDUO. Ces médicaments peuvent être :
 - suppléments en potassium (ainsi que les substituts du sel contenant du potassium)
 - médicaments qui augmentent la quantité d'urine que vous produisez (diurétiques)

- héparine (pour fluidifier le sang)
- laxatifs
- corticostéroïdes
- hormone adrénocorticotrophique (ACTH)
- carbénoxolone (un médicament utilisé pour soigner les ulcères de la bouche et de l'estomac)
- pénicilline G sodique (également appelée « benzylpénicilline », un antibiotique)
- certains médicaments utilisés pour soulager la douleur, comme l'aspirine ou les dérivés de l'acide salicylique

- Lithium (un médicament utilisé pour soigner les changements d'humeur et certains types de dépression).

L'utilisation de ce médicament en même temps que ALTEISDUO peut augmenter la toxicité du lithium. Si vous devez prendre du lithium, votre médecin mesurera votre taux de lithium dans le sang.

- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, médicaments utilisés pour soulager la douleur, les gonflements et les autres symptômes de l'inflammation, dont l'arthrite). L'utilisation de ces médicaments en même temps que ALTEISDUO peut augmenter le risque d'insuffisance rénale et l'effet de ALTEISDUO peut être diminué par les AINS.

- Autres médicaments diminuant la pression artérielle (antihypertenseurs), dont l'utilisation peut augmenter l'effet de ALTEISDUO.

- Médicaments pour dormir, sédatifs et antidépresseurs, dont l'utilisation en même temps que ALTEISDUO peut entraîner une chute soudaine de pression artérielle lors du passage en position debout.

- Certains médicaments tels que baclofène et tubocurarine, utilisés pour relâcher les muscles.

- Amifostine et d'autres médicaments utilisés pour soigner les cancers, tels que cyclophosphamide ou méthotrexate.

- Colestyramine et colestipol, médicaments utilisés pour diminuer les taux de lipides dans le sang.

- Agents anticholinergiques, tels qu'atropine et bipéridène.

- Médicaments tels que thioridazine, chlorpromazine, lévomépromazine, trifluopérazine, cyamémazine, sulpiride, amisulpride, pimozide, sultopride, tiapride, dropéridol ou halopéridol, utilisés pour soigner certains troubles psychiatriques.

- Certains médicaments tels que quinidine, hydoquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol ou digitaliques, utilisés pour soigner des problèmes cardiaques.

- Médicaments tels que mizolastine, pentamidine, terfénaire, dofétilide, ibutilide ou érythromycine injectable, qui peuvent modifier le rythme cardiaque.

- Médicaments antidiabétiques oraux, tels que metformine ou insuline, utilisés pour diminuer le taux de sucre dans le sang.

- Bêtabloquants et diazoxide, médicaments utilisés pour soigner la pression artérielle élevée et les faibles taux de sucre dans le sang, respectivement, car ALTEISDUO peut accroître leur effet sur l'augmentation des taux de sucre dans le sang.

- Médicaments tels que noradrénaline, utilisés pour augmenter la pression artérielle et ralentir le rythme cardiaque.

- Médicaments tels que probénécide, sulfapyrazone et allopurinol, utilisés pour soigner les crises de goutte.

- Suppléments en calcium.

- Amantadine, un médicament antiviral.
- Ciclosporine, un médicament utilisé pour éviter le rejet des organes transplantés.
- Certains antibiotiques appelés « tétracyclines ».
- Amphotéricine, un médicament utilisé pour soigner les infections fongiques.
- Certains antiacides, utilisés pour soigner l'hyperacidité gastrique, tels que l'hydroxyde d'aluminium et de magnésium, dont l'utilisation peut légèrement diminuer l'effet de ALTEISDUO.

Aliments et boissons

ALTEISDUO peut être pris avec ou sans nourriture.

Faites attention lorsque vous buvez de l'alcool alors que vous prenez ALTEISDUO, car certaines personnes se sentent mal ou ont la tête qui tourne. Si cela vous arrive, ne buvez pas d'alcool, y compris du vin, de la bière ou toutes boissons sucrées alcoolisées.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre ALTEISDUO avant d'être enceinte ou dès que vous apprendrez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de ALTEISDUO. ALTEISDUO est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris après plus de 3 mois de grossesse car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer à allaiter. ALTEISDUO est déconseillé chez les femmes qui allaitent, votre médecin peut choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter.

Sportifs

Le diurétique contenu dans ce médicament peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors du contrôle antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Vous pouvez vous sentir endormi ou ressentir des vertiges lorsque vous êtes traité pour votre hypertension artérielle. Si cela vous arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines tant que vos symptômes n'ont pas disparu. Demandez conseil à votre médecin.

Informations importantes concernant certains composants de ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

Ce médicament contient du lactose (une sorte de sucre). Si votre médecin vous a dit que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

La dose usuelle de ALTEISDUO 40 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est d'un comprimé par jour. Cependant, si votre pression artérielle n'est pas contrôlée, votre médecin peut décider d'augmenter la dose à un comprimé de ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé par jour.

Mode d'administration

Avaler le comprimé avec de l'eau. Si possible, vous devez prendre votre dose **à la même heure chaque jour**, par exemple à l'heure du petit-déjeuner.

Si vous avez pris plus de ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, ou si un enfant en a avalé accidentellement, allez immédiatement chez votre médecin ou au service des urgences le plus proche et prenez la boîte du médicament avec vous.

Si vous oubliez de prendre ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la dose suivante au moment habituel. **Ne prenez pas** de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé :

Il est important de continuer à prendre ALTEISDUO à moins que votre médecin ne vous dise d'arrêter.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Cependant, les deux effets indésirables suivants peuvent être graves :

- Un gonflement du visage, de la bouche et/ou du larynx accompagné de démangeaisons et d'éruptions cutanées peuvent survenir très rarement. **Si vous présentez ces effets, arrêtez de prendre ALTEISDUO et prévenez immédiatement votre médecin.**
- Des sensations de tête vide ou des évanouissements peuvent survenir peu fréquemment (une baisse trop importante de la pression artérielle chez des personnes prenant ce type de médicament peut provoquer ces effets). **Si vous présentez ces effets, arrêtez de prendre ALTEISDUO, prévenez immédiatement votre médecin et allongez-vous.**

ALTEISDUO est une association de deux substances actives et les informations suivantes correspondent, d'une part, aux autres effets indésirables rapportés jusqu'à présent avec ALTEISDUO (en plus de ceux déjà mentionnés ci-dessus) et, d'autre part, à ceux connus pour les substances actives prises séparément.

Afin de vous donner une idée du nombre de patients susceptibles de présenter des effets indésirables, ces derniers ont été classés selon leur fréquence : fréquent, peu fréquent, rare et très rare. Ceci correspond au tableau ci-dessous :

Fréquent	Affectant 1 à 10 patients sur 100
Peu fréquent	Affectant 1 à 10 patients sur 1 000
Rare	Affectant 1 à 10 patients sur 10 000
Très rare	Affectant moins d'1 patient sur 10 000
Indéterminé	La fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Voici les autres effets indésirables connus jusqu'à présent avec ALTEISDUO :

Si ces effets indésirables surviennent, ils sont souvent modérés et **ne nécessitent pas l'arrêt du traitement.**

Effets indésirables fréquents :

Sensations vertigineuses, maux de tête, fatigue, douleurs à la poitrine, gonflement des chevilles, des pieds, des jambes, des mains ou des bras.

Effets indésirables peu fréquents :

Faiblesse, accélération des battements du cœur (palpitations), rash, eczéma, vertiges, toux, maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, crampes et douleurs musculaires, douleurs aux articulations, aux bras et aux jambes, mal de dos, difficultés d'érection chez les hommes, sang dans les urines.

Effets indésirables rares :

Troubles de la conscience.

Fréquence indéterminée :

Œdème au niveau de la peau, insuffisance rénale aiguë.

Des modifications des paramètres biologiques sanguins ont été décrites telles que :
Augmentation des taux de lipides, d'acide urique et d'urée dans le sang, augmentation ou diminution des taux de potassium dans le sang, augmentation des taux de calcium et de sucre dans le sang, augmentation des paramètres de la fonction hépatique, augmentation de la créatinine, augmentation de l'azote dans le sang, diminution des valeurs de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Votre médecin connaîtra ces paramètres en faisant des analyses de sang et il vous dira ce qu'il faut faire.

Effets indésirables supplémentaires notés avec l'olmésartan médoxomil seul ou l'hydrochlorothiazide seul :

Olmésartan médoxomil

Effets indésirables fréquents :

Bronchite, écoulement nasal ou nez bouché, douleurs à l'estomac, gastroentérite, infections des voies urinaires, syndrome pseudo-grippal.

Effets indésirables peu fréquents :

Angor (douleur ou sensation désagréable dans la poitrine, connue sous le terme d'angine de poitrine).

Fréquence indéterminée :

Diminution de la fonction rénale, manque d'énergie, démangeaisons, exanthème (éruption cutanée).

Des modifications des paramètres biologiques sanguins ont été décrites telles que :
Augmentation des paramètres de la fonction musculaire et rénale, réduction du nombre de cellules sanguines d'un certain type, appelées «plaquettes » (thrombocytopenie).

Hydrochlorothiazide

Effets indésirables fréquents :

Sensation de confusion, douleurs à l'estomac, indigestion, sensation de ballonnements, constipation.

Effets indésirables peu fréquents :

Diminution ou perte de l'appétit, sensibilité à la lumière.

Effets indésirables rares :

Gonflement et douleur des glandes salivaires, réduction du nombre de globules blancs, réduction du nombre de plaquettes, anémie, atteinte de la moelle épinière, agitation, sensation de déprime ou perte de moral, difficultés pour dormir, sensation de désintérêt (apathie), picotement et engourdissement, crise (convulsions), coloration jaune de la vision, vision floue, sécheresse des yeux, battements du cœur irréguliers, inflammation des vaisseaux sanguins, caillots sanguins (thrombose ou embolie), difficultés pour respirer, inflammation du pancréas, jaunisse, infection de la vésicule biliaire, symptômes de lupus érythémateux tels que rash, douleurs aux articulations et mains et doigts froids, réactions anaphylactiques (réactions d'hypersensibilité), desquamation de la peau et ampoules sur la peau, inflammation non-infectieuse des reins (néphrite interstitielle), fièvre, faiblesse musculaire (provoquant parfois une diminution des mouvements).

Effets indésirables très rares :

Blocage des intestins (iléus paralytique).

Des modifications des paramètres biologiques sanguins ont été décrites telles que : Déséquilibres des électrolytes (modifications des taux de sodium, potassium, calcium, magnésium et chlore dans la sang). Une augmentation du taux de sucre dans les urines a aussi été notée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ALTEISDUO après la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur la plaquette par « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont:

Les substances actives sont l'olmésartan médoxomil et l'hydrochlorothiazide.
Chaque comprimé pelliculé contient 40 mg d'olmésartan médoxomil et 25 mg

d'hydrochlorothiazide.

Les autres composants sont:

Comprimé nu : cellulose microcristalline, lactose monohydraté*, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium.

Pelliculage : talc, hypromellose, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172).

* voir la rubrique « Informations importantes concernant certains composants de ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé » ci-dessus.

Qu'est-ce que ALTEISDUO 40 mg/25 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé rose, ovale, marqué d'un « C25 » sur l'une des faces. Boîtes de 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 10 x 28 et 10 x 30 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées et boîtes de 10, 50 et 500 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées individuelles.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire

LABORATOIRES MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA
1, AVENUE DE LA GARE
1611 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

Exploitant

A.MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL
VIA SETTE SANTI N°1
FLORENCE
ITALIE

Fabricant

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
LUITPOLDSTRASSE 1
85276 PFAFFENHOFEN
ALLEMAGNE
ou
BERLIN-CHEMIE AG
GLIENICKER WEG 125
12489 BERLIN
ALLEMAGNE

ou

QUALIPHAR
RIJKSWEG 192
2880 BORNEM
BELGIQUE

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Autriche : Olmetec Plus, Mencord Plus
Belgique : Olmetec Plus, Belsar Plus
Chypre : Olartan-plus
République Tchèque : Olmetec Plus H, Sarten Plus H
Danemark : Olmetec Plus, Benetor Comp
Estonie : Mesar plus
Allemagne : Olmetec Plus, Olmes Plus, Votum plus
Grèce : Olmetec Plus, Olartan-plus
Finlande : Olmetec Plus, Benetor Comp
France : CoOlmetec, CoOlmes, Alteis Duo
Hongrie : Olmetec Plus, Laresin Plus
Islande : Olmetec Plus, Benetor Plus
Irlande : Benetor Plus, Omesar Plus
Italie : Olmegan, Olprezide, Plaunazide
Lettonie : Mesar plus
Lituanie : Mesar plus
Luxembourg : Olmetec Plus, Belsar Plus
Malte : Omesar plus
Pays-Bas : Olmetec HCTZ
Norvège : Olmetec Comp, Benetor Comp
Portugal : Olmetec Plus, Olsar Plus
République Slovaque : Olmetec Plus, Tenzar Plus
Slovénie : Co-Tensiol
Espagne : Olmetec Plus, Openvas Plus, Ixia Plus
Royaume-Uni : Olmetec Plus

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 06 juin 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).