

BIOCIDAN 0,25 pour mille
Bromure de céthexonium

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

• **DENOMINATION**

BIOCIDAN 0,25 pour mille

• **COMPOSITION**

Bromure de céthexonium 0,025 g
Chlorure de sodium 1,40 g
Eau pour préparations injectablesq.s.p..... 100 ml

• **FORME PHARMACEUTIQUE**

Collyre
Flacon compte-gouttes de 10 ml

• **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE**

ANTISEPTIQUE (Organes sensoriels).

• **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :**

MENARINI FRANCE
1/7, rue du Jura
Silic 528,
94633 RUNGIS cedex

Fabricant :

Laboratoires EXCELVISION
Rue de la Lombardière, BP 131
07104 ANNONAY Cedex

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antiseptique, destiné au traitement d'appoint des affections superficielles de l'œil et de ses annexes.

ATTENTION !

- **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédents d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- **MISE EN GARDE SPECIALE**

En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), interrompre le traitement et consulter votre médecin.

- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.
- Refermer le flacon soigneusement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS, EN PARTICULIER LES AUTRES COLLYRES UTILISES.

- **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

Il n'existe pas de données cliniques. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

- **POSOLOGIE :**

Instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour.

- **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**

Voie ophtalmique.

En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

Utilisation du flacon compte-gouttes :

- Visser à fond le capuchon perforateur afin de percer l'embout du flacon.
- Pour utiliser le collyre, dévisser le capuchon et instiller les gouttes en pressant légèrement le flacon entre le pouce et l'index.
- Instiller le collyre dans l'œil ou les yeux malade(s) en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas.
- Après usage, revisser le capuchon pour assurer la fermeture du flacon et remettre le flacon dans sa boîte.

Attention ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

• **DUREE DU TRAITEMENT :**

En moyenne 7 jours.

Ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : IRRITATION LOCALE, ALLERGIE. EN CE CAS ARRETER LE TRAITEMENT.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

• **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 28 jours après l'ouverture du flacon. Nous vous recommandons de noter la date d'ouverture sur l'emballage.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Octobre 2001.

Logo

MENARINI France, 1/7, rue du Jura
Silic 528 – 94633 RUNGIS Cedex - 01 45 60 77 20