

NOTICE

MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose

Cromogliccate de sodium

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

3. COMMENT UTILISER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTI-ALLERGIQUE LOCAL

(S = organe sensoriel)

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

N'utilisez jamais MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose dans le cas suivant:

- Antécédent d'allergie à l'un des composants du collyre.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose :

Précautions d'emploi

NE JAMAIS LAISSER A PORTEE DES ENFANTS.

NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Jeter l'unidose après utilisation.

Ne pas conserver l'unidose en vue d'une instillation ultérieure.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre. Ne pas conduire ou utiliser des machines dangereuses jusqu'au retour de la vision normale.

3. COMMENT UTILISER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

Posologie

- Adulte et enfant: selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers. Chez l'enfant un avis médical est nécessaire.
- Ne dépassez pas la posologie recommandée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Chaque unidose contient une quantité suffisante de collyre pour traiter les deux yeux.

Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en évitant le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

Fréquence d'administration

Espacez les 2 à 6 instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

Durée du traitement

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

Si vous avez pris plus de MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de survenue de réaction allergique aux composants du produit.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose ?

La substance active est:

Cromoglicate de sodium

..... 2,00 g

Pour 100 ml de collyre.

Les autres composants sont:

Chlorure de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT, collyre en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution en récipient unidose.

Boîte de 10, 12 ou 20 récipients unidoses.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

LABORATOIRES THEA

12, RUE LOUIS BLERIOT

Z.I DU BREZET

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Exploitant

MENARINI FRANCE

1/7, RUE DU JURA

ZONE SILIC - RUNGIS

91320 WISSOUS

Fabricant

LABORATOIRE UNITHER

Z.I LONGPRE

10, RUE ANDRE DUROUCHEZ

80084 AMIENS CEDEX 2

ou

FARMIGEA SPA

VIA GIOVAN BATTISTA OLIVA,6/8

56121 PISA (PI)

ITALIE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18 février 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).