

NOTICE

**MULTICROM UNIDOSES 2 POUR CENT,
collyre en récipient unidose**

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Cromoglycate de sodium..... 2,00 g
Chlorure de sodium, eau purifiée
pour 100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre en récipient unidose.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-ALLERGIQUE LOCAL
(S = organe sensoriel)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :

Laboratoires MENARINI France
1/7, rue du Jura
Silic 528
94633 RUNGIS Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

Laboratoire UNITHER
10, rue André Durouchez
80052 AMIENS CEDEX 2

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie à l'un des composants du collyre.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

Ne pas dépasser la posologie recommandée. En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Jeter l'unidose après utilisation.

Ne pas conserver l'unidose en vue d'une utilisation ultérieure.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

- Adulte et enfant : selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers. Chez l'enfant un avis médical est nécessaire.
- Ne dépassez pas la posologie recommandée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie locale. EN INSTILLATION OCULAIRE

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Chaque unidose contient une quantité suffisante de collyre pour traiter les deux yeux.

Instillez une goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement sur la paupière inférieure vers le bas et en évitant le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

FREQUENCE ET MOMENTS AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE :

Espacez les 2 à 6 instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

DUREE DU TRAITEMENT :

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Possibilité de survenue de réaction allergique aux composants du produit.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNEE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Octobre 2001.

Logo MENARINI

MENARINI France

1/7, rue du Jura

Silic 528

94633 RUNGIS Cedex